

Diagnosi differenziale principali artralgie monoarticolari

| | Artralgia traumatica | Coxite benigna | M.Perthes | Epifisiolisi | M.Osgood-Shlatter |
|----------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Età | ++ scolari e adolescenti | 3-10 aa. | 5-10 aa. | adolescenti | Adolescenti (++ atleti) |
| Sede | Varabile | Anca (spesso dolore riferito al ginocchio) | Anca | Anca | Tuberosità tibilae (dolore riferito al ginocchio) |
| Anamnesi | Trauma | Pregresse infezioni virali | Dolore che si accentua sotto carico | Dolore che si accentua sotto carico | Traumi ripetuti |

Diagnosi differenziale principali artralgie diffuse

| | Patologie | MR, LES | Artralgie virali | Fibromialgia | Ipermobilità articolare |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Età | qualunque | >5 aa. | qualunque | adolescenti | 3-10 aa. |
| Sintomi sistemici | febbre, epato-splenomegalia, calo ponderale | febbre, astenia, pallore | spesso esantema, febbre | spesso con sintomi emotivi | assenti |
| Dolore | Variabile | Diurno | Diurno | Diurno | Spesso dolori notturni intermittenti |

Principali artriti monoarticolari

Diagnosi differenziale_Clinica

| | Artrite Settica | AIG mono-articolari | Artrite traumatica |
|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| Età | ++<2aa. | Qualunque età | ++ scolare e adolescente |
| Sede | Anca, ginocchio, caviglia, gomito | ++ Ginocchia, caviglie | Variabile |
| Anamnesi | Febbre | Dolore mattutino, che migliora nel corso della giornata | Trauma |
| Dolore | Molto intenso | Variabile, in genere modesto | Marcata |
| Impotenza funzionale | Assoluta | Lieve | Variabile |
| Flogosi artic. | Molto intensa | Modesta/assente | Assente |

Principali artriti oligoarticolari

Diagnosi differenziale

| | AIG | Artrite Virale | Artrite Reattiva | MR |
|--------------------|-----|------------------------------------|------------------|-----|
| Migrante | no | si | no | si |
| Flogosi articolare | +/- | Tumefazione modica, dolore intenso | Variabile | +++ |
| Febbre | no | Spesso presente, ma lieve | Variabile | si |

Evidenze per causa organica di dolori agli arti

Caratteristiche dolore

- Si verifica di giorno e di notte
- Si verifica in vacanza e in fine-settimana
- Interruzione del gioco e altre attività piacevoli
- Localizzazione ad una articolazione o area definita Unilaterale
- Zoppia o rifiuto di camminare
- Descrizione appropriata e logica

Storia

Perdita di peso

Febbre

Sudorazione notturna

Esantema

Diarrea

Il caso più frequente:
interessamento di una singola
articolazione

dolore e/o versamento

Anamnesi

- **Anamnesi** non informativa
- Recente infezione virale
- E.O. negativo

Anamnesi per Trauma efficace

7-10 gg di attesa

Radiografia

rivalutazione

Artrite Presente

Migratoria ?

Persistente ?

Artrite scomparsa

- Febbre Reumatica
- Leucemia
- Infezione Gonococcica

- Esami ematici
- Imaging
- Artrocentesi

Artrite Reattiva

Monoartrite

Sintomi associati

Febbre, segni sistemici e locali

A.Settica ?

(artrocentesi per coltura liquido)

Dolore notturno e/o sottocarico; sudorazione, febbre, splenomegalia

NEOPLASIA ?

(esami ematici, midollo osseo)