

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI E DEI CASI POSITIVI

Circolare Ministero della Salute 0051961 del 31/12/2022

CONTATTI STRETTI

Non è prevista la quarantena.

SI APPLICA IL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto:

- a) Obbligo, per i soggetti di età > 6 anni, di indossare FFP2 fino a 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso.
(nessun obbligo sotto i 6 anni di età)
Se nel periodo di sorveglianza compaiono sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 si deve effettuare un test antigenico o molecolare.
- a) Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

SOGGETTI POSITIVI

- a) Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- b) Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- c) Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- d) Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- e) I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

Al termine dell'isolamento è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.