

Calendario vaccinale della Regione Toscana. DRT 1500/2022

Vaccino	Età Mesi										Età Anni															Donne in gravidanza
	Nascita	2	3	3	5	6	12	13	14	15	5-6	6-9	11	12	13	14	15	16	17	18	18-20	21-64	65	65>		
DTPa			DTPa		DTPa		DTPa				DTPa ¹				dTpa/IPV ²					dTpa ²					dTpa ¹⁴	
IPV			IPV		IPV		IPV				IPV															
Epatite B **	HBV ³		HBV		HBV		HBV																			
Hib **			Hib		Hib		Hib																			
MPRV - MPR *										MPRV ⁴	MPRV ⁴				MPR / MPR+Var ⁵											
PCV **			PCV		PCV				PCV																	
Men C **							Men ACWY ⁶				Men C			Men ACWY ⁶												
Men B				Men B ¹⁰		Men B ¹⁰	Men B ¹⁰																			
Varicella *															Var ⁷											
HPV **														HPV ⁸												
Rotavirus		Rota ¹³		Rota ¹³		Rota ¹³																				
Zoster (HZ)																								HZ ¹²		
Influenza **																								Influ ⁹	Influ ¹⁵	

Legenda:

DTPa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare
 dTpa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare per soggetti di età > 7 anni e adulti
 IPV: vaccino antipolio inattivato
 HBV: vaccino antiepatite B
 Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b
 MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
 MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella
 PCV: vaccino antipneumococcico coniugato
 Men C: vaccino antimeningococcico C coniugato
 Men ACWY: vaccino antimeningococcico quadrivalente coniugato ACWY
 Men B: vaccino
 HPV: vaccino antipapilloma virus
 Var: vaccino antivaricella
 Infl: vaccino antinfluenzale
 Rota: vaccino antirotavirus
 HZ: vaccino anti Herpes zoster

Interpretazione delle indicazioni di offerta per età:

3° mese: dal 61° giorno di vita
 5° mese: dal 121° giorno di vita
 6° mese: dal 151° giorno di vita
 13° mese: dai dodici mesi compiuti (12 mesi+1 giorno)
 5-6 anni: dai 5 anni compiuti ai 7 non compiuti
 6-9 anni: dai 6 anni compiuti ai 9 non compiuti
 11-18 anni: dagli undici anni compiuti ai 18 non compiuti
 65 anni: in relazione alla coorte di età oggetto della offerta gratuita per anno (es. nel 2018 coorte dei nati nel 1953)

Calendario vaccinale della Regione Toscana. DRT 1500/2022

Note: Per gli ulteriori dettagli vedere i capitoli specifici dedicati

* Le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, varicella sono offerte gratuitamente a tutti i soggetti anamnesticamente negativi ed ai soggetti a rischio riportati nel capitolo dedicato

** Le vaccinazioni contro Epatite B, Hib, Pneumococco, Meningococco, HPV, Influenza, oltre alle classi di età indicate nel presente calendario, sono offerte gratuitamente a tutti i soggetti a rischio riportati nel capitolo dedicato.

- 1) Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formulazione con vaccino antidifto-tetanico-pertussico acellulare di tipo adolescenziale-adulto (dTpa).
- 2) Un richiamo si somministra all'età di 11-18 anni (preferibilmente a 14 anni), con vaccino dTpa/IPV. I successivi richiami verranno eseguiti ogni 10 anni con vaccino dTpa
Per i soggetti mai vaccinati in precedenza contro il tetano o con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione, somministrare due dosi di dT seguite da una terza di dTpa. E' possibile comunque utilizzare dTpa anche per il ciclo primario (Circolare Ministero della Salute 1174 15/1/2018).
- 3) Ai bambini nati da madri positive per HBsAg, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche anti-epatite B; il ciclo va completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il tredicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni. (vedi capitolo dedicato per le specifiche).
- 4) La vaccinazione MPRV consta di due dosi di cui la prima al 14-15° mese e la seconda a 5-6 anni.
- 5) Per i soggetti suscettibili per una o più delle malattie previste nel vaccino, 2 dosi a distanza di almeno 1 mese l'una dall'altra. Utilizzare MPRV o MPR+V a seconda della tipologia di vaccino disponibile.
- 6) La vaccinazione si compone di tre dosi di cui la prima dal 13° al 15° mese (preferibilmente al 15°), la seconda dose dai 6 anni ai 9, la terza dose dai 13 ai 14 anni. Se richiesta nel primo anno di vita (condizioni particolari di rischio) è prevista la somministrazione di 2-3 dosi in base all'età di inizio. Ai ragazzi nella fascia di età 9-20 (dai 9 anni compiuti al compimento dei 20) già vaccinati con una dose da più di cinque anni, è garantita l'offerta attiva e gratuita della seconda o della terza dose con vaccino coniugato tetravalente ACWY. Nella fase di transizione al nuovo calendario vaccinale con tre dosi, è garantita l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione ai non vaccinati di qualsiasi età fino al compimento dei 20 anni.
- 7) Soggetti anamnesticamente negativi. Somministrare due dosi a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra.
- 8) Vaccinazione universale (femmine e maschi) con offerta attiva e gratuita a 11 anni compiuti. E' possibile utilizzare occasioni opportune per anticipare la vaccinazione a partire dai 9 anni compiuti. Per i maschi l'offerta attiva e gratuita è a partire dai nati nel 2006 ad 11 anni compiuti.
- 9) 1 dose annuale. L'offerta attiva e gratuita può essere estesa ad altre classi di età in base alle indicazioni della Circolare annuale del Ministero della Salute.
- 10) Si effettuano tre dosi, la prima a 76 giorni di vita, dopo 15 giorni dalla somministrazione del vaccino esavalente, la seconda dopo non meno di due mesi, e la terza tra i 12 e i 15 mesi di età con un intervallo di almeno 6 mesi tra la serie primaria e la dose di richiamo, dopo i due anni compiuti, sono sufficienti due dosi da somministrare ad almeno due mesi l'una dall'altra.
- 11) La vaccinazione antipneumococcica nell'età adulta, è introdotta a partire dalla coorte dei sessantacinquenni (nel 2015 i nati nel 1950). La dose con vaccino coniugato è seguita eventualmente da una dose di vaccino polisaccaridico 23 valente.
- 12) La vaccinazione anti-zoster nell'età adulta è introdotta a partire dalla coorte dei sessantacinquenni (nel 2017 nati nel 1952).
- 13) Vaccinazione antirotavirus utilizzare vaccino monovalente in 2 dosi o pentavalente in 3 dosi. Prima dose dal 42° giorno di vita. A partire dalla sesta-ottava settimana di vita, completare il ciclo entro le 24 settimane di vita (vaccino monovalente) o entro le 32 settimane di vita (vaccino pentavalente). Co-somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi di vita (vedi Piano Nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 – note pag. 52-54).
- 14) Somministrare una dose di dTpa ad ogni gravidanza anche se la donna in gravidanza sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia contratto la pertosse. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28a settimana
- 15) Somministrare una dose di vaccino contro l'influenza ad ogni gravidanza (in qualsiasi trimestre della gravidanza) se questa cade nel periodo epidemico.