

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA DISPNEA INSPIRATORIA

	Eta'	Insorgenza	Stato generale	Tosse	Voce	Febbre	Sintomi associati
LARINGITE IPOGLOTTICA	Prevalente nel lattante e nel bambino sotto i 3 anni	Progressiva con sintomatologia non drammatica	Buono	Abbaiente metallica	Normale o lieve disfonia	Modesta o assente	Rinite Modesta faringite
EPIGLOTTITE	Più frequente fra 2 e 6 anni	Sintomatologia rapidamente ingravescente	Compromesso o molto compromesso	Rauca o assente	velata o assente	Elevata o molto elevata	Disfagia e scolo di saliva dalla bocca Ortopnea - stridore inspiratorio
LARINGO-TRACHEO-BRONCHITE GRAVE (BATTERICA)	Qualsiasi età	Sintomatologia ingravescente	Progressivamente compromesso nel giro di 2-3 giorni	Irritativa poi produttiva	Afona	Inizialmente modesta poi molto elevata nelle forme gravi	Dispnea anche espiratoria Segni di interessamento bronchiale alla auscultazione
CORPO ESTRANEO LARINGO-TRACHEALE	Più frequente fra 6 mesi e 3 anni	Improvvisa in pieno benessere	Inizialmente non compromesso	Stizzosa irritativa persistente	Talvolta afonia	Assente	Dispnea ingravescente Possibile cianosi Sputi emoftoici