**Le vaccinazioni nei soggetti
a rischio...
e non dimentichiamo
gli adolescenti...**

*(Meningococco B, Meningococco ACWY,
HPV, Pertosse, Influenza...)*

Giovanni Vitali Rosati

fimPreviene

23 novembre 2019 • LIDO DI CAMAIORE (LU) • UNA Hotel Versilia

Le vaccinazioni nei soggetti a rischio...e non

dimentichiamo gli adolescenti...

*(Meningococco B, Meningococco ACWY,
HPV, Pertosse, Influenza...)*

Giovanni Vitali Rosati

fim Previene

23 novembre 2019 • LIDO DI CAMAIORE (LU) • UNA Hotel Versilia

Vaccinazioni per gruppi a rischio

Patologia

Donne età fertile

***Esposizione
professionale***

***Comportamenti
o
condizioni***

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

OGGETTO: **Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza**
Aggiornamento novembre 2019

Tabella 1: Vaccinazioni in donne in età fertile, in gravidanza e nel puerperio

Vaccinazioni in età fertile		Note
Raccomandate	MPR e varicella	Se non vaccinata e anamnesticamente negativa anche solo a una delle malattie elencate. Ritardare la gravidanza di 4 settimane dopo la vaccinazione
	dTpa	Richiamo ogni 10 anni
	HPV	Nel corso del 12° anno di vita. Raccomandato anche recupero in caso di non vaccinazione in quella età, possibilmente prima dell'inizio dell'attività sessuale
Vaccinazioni in gravidanza		
Raccomandate	dTpa	Dalla 27 ^a alla 36 ^a settimana di gestazione, idealmente intorno alla 28 ^a settimana, e ad ogni gravidanza, indipendentemente dall'anamnesi positiva per malattia o pregressa vaccinazione
	influenza inattivato	In qualsiasi epoca della gravidanza
Controindicate	Vaccini vivi attenuati (MPR, Varicella, zoster), BCG ⁴ , encefalite giapponese ⁵	Vaccini MPR, Varicella, zoster se somministrati non costituiscono indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza
Non raccomandate per dati non disponibili	HPV, Tifo orale (se necessario, preferire la formulazione a subunità iniettabile), pneumococco	Se somministrate non costituiscono indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza
Possibili se beneficio maggiore del rischio	Epatite A, epatite B, IPV ⁶ , meningococco, TBE ⁷ , rabbia, colera, febbre gialla ⁸	Se somministrate non costituiscono indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza
Vaccinazioni nel puerperio*		
Raccomandate	MPR e varicella	Se la donna non è stata vaccinata e se anamnesticamente negativa anche solo a una delle malattie elencate
	dTpa	Se la donna non è stata vaccinata durante la gravidanza. In tale evenienza è altresì opportuna la vaccinazione dei contatti stretti

* L'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione

Donne età fertile

**Prima
della
gravidanza**

**Durante
la
gravidanza**

**Dopo
la
gravidanza**

***Prima
della
gravidanza***

***Dopo
La
gravidanza***

***Vaccini a
virus vivi***

***MPR
varicella***

Hpv

***Durante
la
gravidanza***

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale

PNPV 2017-2019

influenza secondo o terzo trimestre di gravidanza. rischio di ospedalizzazione, di prematurità e basso peso del nascituro e di interruzione di gravidanza. Peraltro, si consiglia la somministrazione anche nella donna in età fertile poiché è stato riportato in letteratura che se una donna era vaccinata prima della gravidanza, la sua probabilità di vaccinarsi anche durante la gestazione era di 4 volte superiore rispetto alle donne non vaccinate in precedenza.

difterite, tetano, pertosse.

la pertosse contratta nei primi mesi può essere molto grave o persino mortale

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale

**Prevenzione e controllo dell'influenza:
raccomandazioni per la stagione 2019-2020**

Regione Toscana

Calendario regionale

Delibera n.1374 del 27-12-2016

Oggetto

Aggiornamento del calendario vaccinale della Regione Toscana e prosecuzione delle misure straordinarie di profilassi per contrastare la diffusione dell'infezione da meningococco C

Ufficio

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Tipo pubblicità

Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Codice pratica

2016DG0000001688

Documenti

Testo Atto

Allegato A - ALLEGATO A

1.1 Vaccinazioni per le donne in età fertile e strategia "cocoon"

La tutela del bambino inizia con la protezione della futura madre e del nucleo familiare, pertanto, tutte le donne in età fertile dovrebbero essere correttamente informate e vaccinate già prima del concepimento. E' inoltre fondamentale l'immunizzazione di tutto il personale sanitario coinvolto nell'assistenza alla coppia madre- bambino

La protezione del bambino inizia quindi con la verifica dello stato immunitario della futura madre e del nucleo familiare. E' importante che la futura mamma e tutto il nucleo familiare siano protetti per morbillo, rosolia, varicella, difterite, tetano e pertosse. Per i vaccini vivi

Difterite tetano pertosse	NN	Negativa per vaccinazione	3 dosi: 2 dT + 1 dTpa (3) (4)
		Positiva per vaccinazione	1 dose booster con dTpa dopo la 27° settimana e preferibilmente tra la 27° e la 32° settimana
Influenza	NP	Gestazione in periodo epidemico	1 dose dal 2°-3° trimestre di gravidanza

Nascere in Toscana

Il percorso nascita inizia con il ritiro del **libretto di gravidanza**, un vademecum contenente le richieste di tutti gli esami periodici previsti durante la gestazione. Le prestazioni indicate nel libretto sono gratuite e assicurano il monitoraggio della gravidanza fisiologica.

Le eventuali prestazioni aggiuntive in caso di gravidanza a rischio sono comunque gratuite purché prescritte dal medico di famiglia o da uno specialista.

- A chi rivolgersi durante la gravidanza
- Il libretto di gravidanza ▶▶
- I corsi di preparazione alla nascita ▶▶
- Il parto ▶▶
- E se il bambino nasce prima? ▶▶
- Le modalità di parto ▶▶
- Dopo il parto ▶▶
- Il ritorno a casa ▶▶
- Qualità e sicurezza nei servizi ▶▶
- Dove informarsi sui servizi dell'Azienda Usl ▶▶

Regione Toscana

Servizio Sanitario Nazionale
REGIONE TOSCANA

Federazione Toscana
degli Ordini dei Medici

**PROTOCOLLO PER LE INDAGINI
DI LABORATORIO E STRUMENTALI CONSIGLIATE
NELLA GRAVIDANZA FISIOLÓGICA**

Il presente libretto, timbrato e numerato foglio per foglio con numerazione unica aziendale, viene consegnato dal personale ostetrico dei servizi territoriali/consultoriali delle aziende sanitarie unitamente alla cartella ostetrica compilata nei dati anamnestici.

OBIETTIVI

1. Uniformare il controllo della gravidanza in tutta la Regione Toscana definendo uno standard minimo di accertamenti in assenza di rischio specifico e di patologie definite.
2. Definire modalità operative e strategie assistenziali comuni fra specialista ginecologo, ostetrica e medico di medicina generale.
3. Creare un ricettario per la gravidanza fisiologica quale strumento operativo per favorire l'accesso alle prestazioni.
4. Fornire un agile strumento di medicina preventiva.

*Redazione a cura della
Regione Toscana - Giunta Regionale*

LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE IN TOSCANA

I tassi annuali calcolati sui casi degli anni 2013-2017, confermano che le incidenze maggiori sono riferite alle età inferiori all'anno di vita.

Tassi grezzi medi annuali ogni 100.000 ab. per classe di età e genere. Toscana, anni 2013-2017. Fonte: ARS su SIMI

Effectiveness of pertussis vaccination and duration of immunity

Shwartz KL et al.
CMAJ 2016

persistenza di anticorpi anti-*Bordetella pertussis* dopo l'infezione

De Melker *et al.* J Infect 2006; 53: 106-113

persistenza di anticorpi anti-*Bordetella pertussis* dopo l'infezione per fascia di età

Versteegh FG *et al.* Epidemiol Infect 2005; 133: 737-748

I **familiari** sono veicolo di infezione ai bambini di età inferiore ai 6 mesi nell' **83%** dei casi

Castagnini LA. Clin Infect Dis 2012;54:78-84
Forsyth K et al. Vaccine 2007; 25: 2634-2642

Contatti casuali sono fonte di contagio nel **34%** dei casi nei bambini sotto l'anno di età

Healy CM. Clin Infect Dis 2012;33:554-7

Vaccine

origine della pertosse in lattanti: review delle prove

Wiley KE *et al.* Vaccine 2013; 31: 618-625

**valutati nove studi che soddisfacevano i
criteri di inclusione**

madre : 39 % (95% LC: 33-45%)

padre : 16 % (95% LC: 12-21%)

nonni : 5 % (95% LC: 2-10%)

fratelli : 6-43%

contatti non domestici: 4-22%

sorgente non identificata: 52 %

Safety and Immunogenicity of Tetanus Diphtheria and Acellular Pertussis (Tdap) Immunization During Pregnancy in Mothers and Infants: A Randomized Clinical Trial

Munoz FM et al. **JAMA** 2014;311:1760-

48 DONNE: 33 vaccinate con dTap 30-32 settimane
15 con placebo a 30-32 e dTap nel *post partum*

Vaccino dTap in gravidanza:

- non aumento di eventi avversi in donna e bambino
- concentrazioni di anticorpi più alta nei primi due mesi di vita del bambino
- non sostanziale alterazione della risposta anticorpale del bambino alle vaccinazioni successive
- stessa immunogenicità rispetto a donne vaccinate non in gravidanza o nel *post partum*

INFLUENZA

è pericolosa per le donne in gravidanza:

- sono più suscettibili all'infezione e
- sono più a rischio di ospedalizzazione e forme gravi

Meijer WJ et al. **Influenza virus infection in pregnancy: a review**. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:797-819.

INFLUENZA

è pericolosa per le donne in gravidanza:

- sono più suscettibili all'infezione e
- sono più a rischio di ospedalizzazione e forme gravi

Meijer WJ et al. **Influenza virus infection in pregnancy: a review.** Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:797-819.

....ed è pericolosa per il bambino:

- aumentato rischio di palatoschisi, idrocefalo, difetti cardiaci, dell'apparato gastro-intestinale e del tubo neurale
- aumentato rischio di parto pretermine e basso peso

Influenza and congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis

J.M. Luteijn*, M.J. Brown, and H. Dolk

[Hum Reprod.](#) 2014 Apr;29(4):809-23

Coperture vaccinali donne in gravidanza

Rilevazione della Copertura Vaccinale per Influenza in Italia, ISS, MoH

Corso di preparazione alla nascita

Pediatra

Ostetriche

Ginecologi

Vaccinazioni per gruppi a rischio

Patologia

Donne età fertile

***Esposizione
professionale***

***Comportamenti
o
condizioni***

Esposizione professionale

categorie professionali che lavorano a contatto con soggetti e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione.

Operatori sanitari

Operatori scolastici

***Lavoratori a contatto con
animali***

***servizi pubblici di primario
interesse collettivo***

Perché è importante Vaccinare per flu?

- Proteggere se stessi
- Non diffondere la malattia
- Evitare di creare disservizi
- Esempio per la popolazione

Copertura vaccinazione antiinfluenzale in OS

- USA 2011 (autoriportata) 64%
- UK 2011 35%

- ITALIA: 2015
 - Milano 17%
 - Palermo 14%
 - Toscana 17,5%

Regione Toscana – copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari campagne 2014-2015 e 2015-2016

AZIENDA USL	2014-2015	2015-2016
1	10,2	8,3
2	14,2	10,6
3	13,9	13,1
4	15,8	8,3
5	12,1	9,6
6	8,3	6,6
7	13,2	20,5
8	17,2	21,2
9	10,4	16,5
10	41,1	25,4
11	11,5	17,9
12	15,6	13,9
copertura regionale	17,5	15,0

.....e in Italia?

Fonte: Istituto Superiore di Sanità

Calcolate sulla base dei dati relativi alle dosi somministrate ed alla popolazione target fornite delle regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, P.A. Trento, Valle d'Aosta e Veneto.

Cosa si è fatto finora?

Influenza vaccination among healthcare workers in Italy

Cristiano Alicino, Rocco Iudici, Ilaria Barberis, Chiara Paganino, Roberto Cacciani, Monica Zacconi, Angela Battistini, Dorotea Bellina, Anna Maria Di Bella, Antonella Talamini, Laura Sticchi, Alessandra Morando, Filippo Ansaldo & Paolo Durando

Promozione attiva in

IRCCSS San Martino
di Genova

Promozione

educazione

Facilità di accesso
alla vacc

- 1. Materiale promozionale** tra cui manifesti pubblicitari appesi
- 2. sollecitazione diretta**
- 3. lettere inviate** a tutti gli OS, spiegando come e perché il vaccino è raccomandato,
- 4. Facile accesso alla vaccinazione**

Influenza vaccination among healthcare workers in Italy

Cristiano Alicino, Rocco Iudici, Ilaria Barberis, Chiara Paganino, Roberto Cacciani, Monica Zacconi, Angela Battistini, Dorotea Bellina, Anna Maria Di Bella, Antonella Talamini, Laura Sticchi, Alessandra Morando, Filippo Ansaldi & Paolo Durando

Promozione attiva in os

IRCCSS San Martino di Genova

Figure 3. Vaccination coverage rates to occupation type among healthcare workers (HCWs) of IRCCS AOU San Martino, IST of Genoa included and not included in the pilot project.

Human Vaccines & Immunotherapeutics

2015

ISSN: 2164-5515 (Print) 2164-554X (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/khvi20>

Influenza vaccination among healthcare workers in Italy

Cristiano Alicino, Rocco Iudici, Ilaria Barberis, Chiara Paganino, Roberto Cacciani, Monica Zacconi, Angela Battistini, Dorotea Bellina, Anna Maria Di Bella, Antonella Talamini, Laura Sticchi, Alessandra Morando, Filippo Ansaldi & Paolo Durando

Promozione attiva in os

IRCCSS San Martino di Genova

Nonostante quasi un decennio di sforzi, i tassi di copertura vaccinale registrati nel nostro ospedale rimangono costantemente insoddisfacenti e molto distanti dal minimo

BMJ Open Determinants of adherence to seasonal influenza vaccination among healthcare workers from an Italian region: results from a cross-sectional study

P Durando,^{1,2} C Alicino,¹ G Dini,^{1,2} I Barberis,^{1,3} A M Bagnasco,¹ R Iudici,¹ M Zanini,¹ M Martini,¹ A Toletone,^{1,2} C Paganino,^{1,3} E Massa,^{1,2} A Orsi,^{1,3} L Sasso¹

Perché non si vaccinano??

Disaccordo su vacc

Efficacia vacc

Paura eventi avversi

Buone pratiche per aumentare le coperture vaccinali fra gli operatori sanitari

Maria Grazia Pascucci
Roberto Cagarelli
Servizio sanità pubblica
Assessorato Politiche per la salute

MILIA ROMAGNA: GLI OPERATORI SANITARI DOVRANNO ESSERE VACCINATI

Emilia Romagna: gli operatori sanitari dovranno essere vaccinati

12 marzo 2018

Medici, infermieri e ostetriche che lavorano in reparti a rischio dovranno essere immunizzati contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. Cruciale il tema delle vaccinazioni fra gli operatori sanitari

Vaccinazione operatori sanitari. La "Carta di Pisa" promossa in tutta Italia

DI INSALUTENEWS - 7 GIUGNO 2017

Pisa, 7 giugno 2017 – Pisa fa da apripista in campo nazionale sulle vaccinazioni degli operatori sanitari. Sono infatti ben 7 le società scientifiche che hanno sottoscritto la Carta di Pisa come Consensus al termine di un convegno promosso dalla Simpios- Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie ed altri sodalizi scientifici, svoltosi a Pisa a marzo, dal titolo: "Medice, cura te ipsum" (fra i promotori pisani i

professori Gaetano Privitera, Pier Luigi Lopalco, Alfonso Cristaudo e Rudy Foddis).

CARTA DI PISA

3. Attuare azioni mirate alla formazione e consapevolezza dei rischi infettivi negli OS

4. Introdurre forme di promozione della vaccinazione e forme di incentivazione adeguate al contesto di lavoro degli OS.

5. Introdurre forme di obbligo laddove altre azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di copertura non abbiano funzionato

Vaccinazioni per gruppi a rischio

Patologia

***Donne età
fertile***

***Esposizione
professionale***

***Comportamenti
o
condizioni***

Vaccinazioni per gruppi a rischio

Patologia

condizioni morbose (patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressione, etc.) che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive

influenza

- **Vaccino anti-influenzale:** obiettivo primario della vaccinazione anti-influenzale è la prevenzione delle forme gravi di influenza in particolare nelle categorie a maggiore rischio di patologia complicata. Pertanto, oltre ai soggetti a rischio per età, la vaccinazione è raccomandata a tutti i soggetti oltre i sei mesi di vita nelle seguenti condizioni patologiche:
 - malattie croniche dell'apparato respiratorio (incluse l'asma di grado severo, le displasie polmonari, la fibrosi cistica e la Bpco)
 - malattie dell'apparato cardio-circolatorio (incluse le cardiopatie congenite e acquisite)
 - malattie metaboliche quali diabete mellito o obesità con Bmi>30 e gravi patologie associate
 - soggetti affetti da patologie neoplastiche
 - insufficienza renale/surrenalica cronica
 - malattie epatiche croniche
 - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
 - malattie ematologiche ed emoglobinopatie
 - immunodeficienze congenite o acquisite compresa l'infezione da Hiv e le forme di immunodepressione iatrogena da farmaci
 - patologie per le quali sono programmati interventi di chirurgia maggiore
 - patologie associate a un incrementato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie quali le malattie neuromuscolari
 - soggetti splenectomizzati
 - bambini o adolescenti in terapia a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di sviluppare sindrome di Reye in caso di sopraggiunta infezione influenzale
 - soggetti di qualunque età residenti in strutture socio-sanitarie, in particolare anziani e disabili
 - **soggetti conviventi con persone appartenenti a categorie a elevato rischio.**

OBIETTIVI DI COPERTURA PER TUTTI I GRUPPI TARGET

Obiettivo minimo

Obiettivo ottimale

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE COPERTURE NELLA FASCIA DI

ETÀ $\geq$ 65 ANNI - PER 100 ABITANTI

Stagioni 1999-00 / 2018-19

Vaccinazione antinfluenzale COPERTURE VACCINALI soggetti a rischio 18-64 anni

Soggetti tra 0-64aa con almeno una condizione di rischio

25% della popolazione 0-64 anni *

Copertura vaccinale influenza nei soggetti 18-64 con condizioni di rischio**

* ISTAT

** Passi Surveillance System, 2014-2018

Fonte: Influnet, ISS

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dell'Influenza, ISS

riflessione

Negli ultimi anni si sono fatti molti passi
avanti nella studio dell'influenza
delle sue complicità e implicazioni
e molte nazioni
hanno iniziato a considerarla
un'emergenza

l'Italia non è tra queste

Noi continuiamo a considerarla una
Problema solo di alcuni e una banalità per
gli altri

11/26/2019

Footer Text

vaccinazione antinfluenzale:

**Vaccinazione
nel
Bambino a rischio**

**Vaccinazione
nel
Bambino sano**

Come si comportano le altre Nazioni?

In USA e Canada
è raccomandato in età pediatrica
dopo i 6 mesi di vita

Dal 2004

Come si comportano le altre Nazioni?

Recommendations for Prevention and
Control of Influenza in
Children, 2019–2020

COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES

American Academy
of Pediatrics

DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™

L'AAP raccomanda la vaccinazione di

tutti i bambini dai 6 mesi in su

per evitare tanti casi gravi e decessi

(116 l'ultima stagione)

L'American Academy of Pediatrics (AAP) ha ribadito di non avere preferenza per il vaccino antinfluenzale attenuato vivo (LAIV) o per i vaccini antinfluenzali inattivati (IIV) per i bambini, ma ha affermato che entrambi i tipi saranno quadrivalenti (a quattro ceppi)

Come si comportano le altre Nazioni?

An Advisory Committee Statement (ACS) National Advisory Committee on Immunization (NACI)

Canadian Immunization Guide Chapter on
Influenza and Statement on Seasonal Influenza
Vaccine for 2019–2020

PROTECTING AND EMPOWERING CANADIANS TO IMPROVE THEIR HEALTH

Public Health Agency of Canada /
Agence de la santé publique du Canada