







# Quando è necessario effettuare tre iniezioni contemporaneamente in un bambino di età < 1 anno

- 1) Le vaccinazioni vengono effettuate nel muscolo vasto laterale (parte antero-laterale della coscia)  11%
- 2) Si possono effettuare fino a due iniezioni nello stesso sito, a condizione che la distanza fra i due inoculi sia di circa due- due centimetri e mezzo  75%
- 3) E' preferibile fare una seduta vaccinale in più  13%




L'età minima per la prima vaccinazione esavalente?  
(antitetano, pertosse, difterite, epatite B, Haemophilus  
influenzae, poliomielite) è






Se il bambino è prematuro per la prima vaccinazione esavalente è necessario aspettare almeno 12 settimane di vita






L'intervallo minimo fra la 1° e la 2° dose di esavalente + pneumococco è di





L'intervallo minimo fra la 2° e la 3° dose di esavalente + pneumococco è di





Se il ciclo della vaccinazione esavalente si effettua in ritardo fra l'ultima dose e il richiamo DTP dei 5-6 anni devono intercorrere almeno 2 anni





Il vaccino anti Pneumococco è offerto gratuitamente fino ai 2 anni, anche per coloro che vogliono fare 2 sole dosi dopo l'anno?







Il vaccino antipneumococcico è offerto gratuitamente fra 2 e 5 anni per le sole categorie a rischio?







La vaccinazione antimeningococcica nel primo anno di vita è offerta a tutti?

1) Si



24%

2) No




76%



# Il vaccino antimeningococcico può essere associato al vaccino esavalente?


- 1) Si
- 2) No





Se è passato più di un anno tra prima e seconda dose di antitetanica, si ricomincia daccapo?

- 1) Si
- 2) No





Se sono passati più di cinque anni fra seconda e terza dose di antitetanica, si ricomincia daccapo?






Per il richiamo difterite/tetano/pertosse dei 12-14 anni, se è stata effettuata in ritardo devono passare almeno otto anni dall'ultima dose, se era stata effettuata la vaccinazione di base con 3 dosi






Se un bambino ha effettuato l'MPR al 13° mese e la prima dose di varicella dal proprio pediatra, quando è meglio che effettui, la seconda dose di varicella?





L'Igiene pubblica prevede che se un bambino di 2 anni ha effettuato MPR al 13° mese








Un bambino che ha effettuato la prima dose di MPR al 13° mese e MPRV al 6° anno, effettuerà la seconda dose di antivaricella

- 1) Alla prima occasione opportuna (cioè in occasione di altra vaccinazione) 74%
- 2) E comunque al 14° anno insieme a DTP, meningococco 26%
- 3) Non effettuerà una seconda dose in tal caso ne basta una sola 0%



Un Bambino di 3 anni che ha effettuato al 13° mese MPR si presenta in consultorio con regolare appuntamento CUP, richiedendo la vaccinazione Antivaricella, cosa facciamo?





Un bambino al 13° mese o a 5-6 anni non ha effettuato MPRV per scelta, ma solo MPR e dopo qualche mese richiede antivaricella, deve rivolgersi al proprio Pediatra?

1) No, l'effettuazione della vaccinazione deve essere considerata come recupero di inadempiente per varicella




2) Si





Un Bambino che effettua la I<sup>a</sup> antivaricella a 5-6 anni con MPRV (al 13 mese aveva fatto MPR) ed effettua la seconda dose alla prima occasione utile (14 anni) deve fare






Il vaccino quadrivalente anti morbillo, rosolia, parotite e varicella (MPRV) può essere effettuato






Un bambino immigrato che ha effettuato le vaccinazioni previste per il primo anno nel proprio Paese con un calendario diverso, deve essere considerato comunque coperto?







Un bambino immigrato di 5 anni che aveva fatto un esavalente nel primo anno di vita, la seconda nel 3° anno di vita e poi a 4 anni e mezzo aveva fatto un DTP. Come si proseguire con i cicli vaccinali?







La asl 10 offre il vaccino anti-rotavirus in associazione al vaccino esavalente e con il contributo alla spesa di 50 euro per tutto il ciclo vaccinale. In alternativa può essere effettuata dal proprio pediatra con il pagamento del Tiket (50 euro) e della prestazione

- 1) Vero
- 2) Falso






Il vaccino anti-rotavirus se abbiamo a disposizione Rotarix si effettua in due dosi in concomitanza rispettivamente della prima e seconda dose di vaccino esavalente entro e non oltre le 24 settimane di età

1) Vero		0%
2) Falso		0%



# Il vaccino Antipapillomavirus





# Il vaccino Boostrix può essere associato a Varicella al 14° anno?

1) Si



2) No






Tutte le richieste "personalizzate", cioè se il genitore richiede di effettuare le vaccinazioni separate, per convinzioni personali, quindi con un numero di accessi agli ambulatori diverso da quanto indicato dal Calendario delle vaccinazioni, deve essere indirizzato al pediatra di famiglia?







Un bambino immigrato di 12 anni non vaccinato nel proprio paese per HBV ed in regola con DTP e Polio, per richiamare l' HBV si dovrà utilizzare vaccinato con il tipo






Bambino americano di 3 mesi che in America ha fatto già due dosi di vaccino di epatite B. Adesso il b. ha tre mesi e vive in Italia, la madre non riesce a trovare in farmacia un vaccino pentavalente (senza epatite B)

- 1) Può fare il normale calendario italiano (alla fine avrà fatto 5 dosi di epatite B anziché 3)  50%
- 2) E' meglio che cerchi un vaccino combinato non contenente l'Epatite B (troppe dosi determinano effetti collaterali locali)  50%







# Un bambino con raffreddore e/o tosse catarrali senza febbre, può essere vaccinato?





Dopo il vaccino anti-rotavirus le feci del bambino contengono virus per diversi giorni quindi

- 1) Ciò comunque non costituisce un problema  50%
- 2) E' indispensabile adottare misure preventive (guanti x cambio pannolino) ed allontanare eventuali fratelli  50%



Bimba sieropositiva nata da madre HIV positiva. La bambina ha presentato fin dalla nascita Diplegia Spastica.

Può effettuare le vaccinazioni secondo il Calendario Nazionale?

1) Si



2) No





Se un operatore rimanda una vaccinazione in un bambino con rinite e/o tosse catarrali senza febbre si assume una responsabilità

- 1) Maggiore
- 2) Minore

